

ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ

Стычивская Е.В., Семенов В.М.

*УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов
медицинский университет»*

Введение. Вирус гепатита С (HCV) является одной из серьезных проблем здравоохранения. Заболеваемость ВГС возрастает, и ожидается, что такая динамика сохранится в течение ближайших десятилетий.

Целью данной работы была оценка эпидемиологической ситуации по ХВГ различной этиологии по Витебской области в республике Беларусь.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 1495 больных хроническими вирусными гепатитами и циррозами, из которых HCV этиология установлена у 1114 (74,52±1,13%) больных. HBV - у 333 (22,27±1,08%), микст - 48 (3,21±0,46%) (HCV+HBV - 32 (66,67±6,88%), HBV+HDV - 10 (20,83±5,92%), HCV+HBV+HDV - 6 (12,5±4,82%)). Достоверно чаще заболевание встречалось у представителей мужского пола (52,87±1,61% vs 46,60±1,61%, $p<0,0001$). Анализ возрастной структуры заболевших показал, что хронический вирусный гепатит С встречался преимущественно в возрастной категории 20-40 лет (60,74±1,59%), реже - у лиц 40-60 лет (28,74±1,47%). Вирусный же гепатит В практически с одинаковой частотой встречался у лиц 20-40 и 40-60 лет (46,65±2,70% и 37,03±2,61%, соответственно).

Обращает на себя внимание, что для гепатита В более характерным, чем для гепатита С было поражение детской категории населения (4,66±1,14% vs 1,05±0,33%, $p<0,0001$).

Проведенный анализ так же показал, что хронические вирусные гепатиты и циррозы вне зависимости от этиологии достоверно чаще регистрировались у жителей города (92,58±1,14%, $p<0,0001$). Гепатиты С чаще характеризовались умеренной степенью активности (59,24±1,62%), гепатиты В достоверно чаще протекали с минимальной активностью (72,34±2,92%, $p<0,0001$).

Указание на парентеральный путь передачи имели 21,04±1,14% пациентов, например употребление наркотиков в анамнезе зарегистрировано у 5,12±0,62%, вертикальный путь передачи отмечался у 1,89±0,38%; 6,46±0,69 больных хроническими вирусными гепатитами являются медработниками. У большинства больных (78,96±1,14%) путь заражения не известен.

Результаты и обсуждение. Проведенные исследования показали, что основной группой риска по инфицированию вирусными гепатитами являются жители города трудоспособного возраста - 20-60 лет.

Для вирусного гепатита В более характерным, чем для гепатита С, является поражение детей. Вирусный гепатит С чаще протекает с умеренной степенью активности, гепатит В - с минимальной.

В Витебской области заболеваемость хроническим вирусным гепатитом С на 100 тысяч населения в 2008 году значительно превышает заболеваемость вирусным гепатитом В (8,19 vs 2,68). Эти данные подтверждают высокий уровень распространенности ВГС в данной местности.